

## **COMUNICADO OFICIAL PARA SECTOR EDUCACIÓN**

La Gerencia Regional de Educación La Libertad en coordinación con la GERESA y considerando la **DECLARATORIA DE EMERGENCIA** debido al riesgo elevado por el **SINDROME GUILLAIN - BARRÉ**, dispone las siguientes **ACCIONES PREVENTIVAS** en toda IIEE PÚBLICA, PRIVADA O POR CONVENIO, bajo responsabilidad de directores, promotores y DIRECTORES DE UGELES:

1. Desarrollar el tema **SINDROME GUILLAIN- BARRÉ** del 10 al 14 de junio: definición, características, síntomas, prevención y otras consideraciones
2. Elaborar y difundir las medidas preventivas en toda la comunidad educativa.
3. Asegurar limpieza permanente en SSHH, cocinas, comedor, kiosko, cafetería.
4. Asegurar la **NO ACUMULACIÓN** de basura al interior y espacios externos del local escolar.
5. Asegurar el **LAVADO DE MANOS** después de actividades como recreos, educación física, y otras actividades
6. Establecer comunicación constante con el centro de salud más cercano.

LA GERENCIA

---

*"Juntos por la prosperidad"*

Sede Institucional: Av. América Sur N° 2870 – Central Telefónica: 28-41-99

Página Web: [www.grell.gob.pe](http://www.grell.gob.pe) Facebook: GRELL

# ¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ?

► Es una afección caracterizada por presentar **debilidad muscular y pérdida de sensibilidad.**

► El sistema inmunitario ataca los nervios periféricos que:

- Controlan los movimientos musculares.
- Transmiten sensaciones doloras, térmicas y táctiles.

## ► SÍNTOMAS:

- Debilidad u hormigueo en las piernas que se extiende a los brazos y la cara.

Suelen durar **pocas semanas.**

## EN LOS CASOS GRAVES:



Puede producir una parálisis casi total.



Afecta el habla, la deglución y la respiración.



El paciente pasa a cuidados intensivos.

Potencialmente **mortales.**

## DEBES SABER QUE:



Es más frecuente en adultos y hombres.



Puede ser mortal.



No tiene cura.

## CAUSAS:



- Infecciones bacterianas o virales.
- Desencadenado por vacunaciones o intervenciones quirúrgicas.
- La infección por el virus de Zika es otro posible desencadenante.

## TRATAMIENTO:



- Inmunoterapia.
- Rehabilitación para fortalecer la musculatura y restaurar el movimiento.

Los pacientes **deben ser hospitalizados** para que estén vigilados.

Los síntomas **pueden mejorar** y acortar su duración.

Se obtienen mejores resultados cuando el **tratamiento se inicia 7 a 14 días** después de los síntomas.



Entre el **3% a 5%** de los pacientes mueren por complicaciones.